


FLORTOP

CURA RÁPIDO

**Fórmula:**

Cada 100 g contém:

Florfenicol 2,0 g
Excipiente q.s.p.100,0 g

Indicação:

Potente Antimicrobiano de amplo espectro de ação, com atividade primariamente bacteriostática sobre um grande número de micro-organismos Gram-Positivos e Gram-Negativos, sendo especialmente indicado para o controle e tratamento de infecções respiratórias dos suínos causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae* e *Pasteurella multocida*.

Dosagem:

Dosagem básica para suínos: 1 a 2 mg por Kg de Peso Vivo. Misturar de 1 a 2 kg (20 a 40 ppm) por tonelada de ração durante 7 a 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.

Modo de Utilização:

Via Ração: Recomenda-se realizar uma pré-mistura da dosagem calculada em uma pequena quantidade de ração antes de misturar a quantidade prevista de ração para o consumo.

Modo de Conservação:

Manter as embalagens fechadas em local seco e fresco, protegidos da luz e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Preparações a base de Florfenicol devem ser armazenadas em temperaturas inferior a 40° C, de preferência entre 15° C e 30° C.

Medidas de Precaução:

- Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
- Alterações nas dosagens somente através de prescrição e orientação do Médico Veterinário.
- A ração medicada deverá ser a única fonte de alimento administrada aos suínos durante o tratamento.
- Manter o produto longe do alcance das crianças.
- As embalagens vazias devem ser enterradas ou incineradas. Não descartar em rios ou lagos.

Contra indicações e limitações de uso:

- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.
- Este medicamento não deverá ser utilizado quando existirem prévias reações alérgicas ao Florfenicol.
- Nenhuma interação medicamentosa específica para Florfenicol foi registrada, mas a droga pode se comportar de forma semelhante ao Cloranfenicol. Se assim for, Florfenicol pode antagonizar a atividade bactericida das penicilinas ou aminoglicosídeos. Este antagonismo não foi demonstrado in vivo, e estas combinações de drogas têm sido usadas com sucesso, muitas vezes, clinicamente.

Período de Carência:


Suspender o uso da medicação 16 dias antes do abate dos animais destinados ao consumo humano.

Apresentação:

Embalagem contendo saco de 25 kg.

FLORTOP

CURA RÁPIDO



Atenção:

O Fortop não se destina para uso em seres humanos

Classe Terapêutica:

Antimicrobiano

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):

Licença nº 10.094. Aprovado em 09/06/2015.

Responsável Técnico:

Dr.Luis Cesar Bellagamba - CRMV SP 02744