


FLUP

EFICÁCIA COM SEGURANÇA

**Fórmula:**

Cada 100 g contêm:

Flubendazole 6,0 g
 Excipiente q.s.p.100,0 g

Indicação:

Formulação anti-helmíntico benzimidazólico de amplo espectro de ação para uso oral, ativo contra estágios maduros e imaturas de nematoides e cestoides de aves.

É indicado para o tratamento e controle das infecções gastrintestinais e pulmonares das aves (*Gallus gallus*) causadas por *Ascaridia sp*, *Heterakis sp* e *Raillietina sp*.

Dosagem:

Para o controle da *Ascaridea sp* e do *Heterakis sp*, fornecer às aves 1,90 mg de Flubendazol por Kg de peso vivo durante 7 dias consecutivos.

Na tabela abaixo, encontram-se quantidades do produto que devem ser adicionadas à ração, correspondente à dose de princípio ativo, indicada acima.


Categoria de ave	Quantidade do produto, em gramas por tonelada de ração	Concentração Flubendazol (princípio ativo) na ração medicada	
		Gramas / ton	ppm
Frangos de Corte e Poedeiras Comerciais	500	30	30
Matrizes Pesadas	670	40	40

Para o controle da *Raillietina sp*, fornecer às aves 3,80 mg de Flubendazol por Kg de peso vivo, durante 7 dias consecutivos. Na tabela abaixo, encontram-se quantidades do produto que devem ser adicionadas à ração, correspondente à dose de princípio ativo.

Categoria de ave	Quantidade do produto, em gramas por tonelada de ração	Concentração Flubendazol (princípio ativo) na ração medicada	
		Gramas / ton	ppm
Frangos de Corte e Poedeiras Comerciais	1000	60	60
Matrizes Pesadas	1400	84	84

FLUP

EFICÁCIA COM SEGURANÇA

**Modo de Utilização:**

Recomenda-se realizar uma pré-mistura da dosagem calculada em uma pequena quantidade de reação antes de misturar a quantidade prevista de ração para o consumo.

A ração medicada deve ser a punica fonte de alimento durante o período alimentar.

Modo de Conservação:

Manter as embalagens fechadas em local seco e fresco, protegidos da luz e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Preparações de Flubendazol e devem ser armazenadas em temperaturas inferior a 40° C, de preferência entre 15° C e 30° C.

Medidas de Precaução:

- Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
- Alterações nas dosagens somente através de prescrição e orientação do Médico Veterinário.
- A ração medicada deverá ser a única fonte de alimento administrada às aves durante o tratamento.
- Manter o produto longe do alcance das crianças.
- As embalagens vazias devem ser enterradas ou incineradas. Não descartar em rios ou lagos.

Contra indicações e limitações de uso:

- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.
- Não há contra indicações nas doses indicadas.
- O Flubendazol e não possui efeitos adversos sobre a produção e incubação dos ovos quando respeitadas as dosagens indicadas.

Período de Carência:

Aves: Suspender o uso da medicação das aves 5 dias antes do abate.

Ovos: Suspender o uso da medicação das aves 2 dias antes de destinar os ovos para o consumo humano.

Apresentação:

Embalagem contendo saco de 25 kg.

Atenção:


O Flup não se destina para uso em seres humanos

Classe Terapêutica:

Antiparasitaria

FLUP

EFICÁCIA COM SEGURANÇA



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):

Licença nº 9.966. Aprovado em 21/11/2014.

Responsável Técnico:

Dr. Luis Cesar Bellagamba - CRMV SP 02744