


OXITOP

RESOLVE



Fórmula:

Cada 100 g contêm:

Oxitetraciclina	50,0 g
Excipiente q.s.p.	100,0 g

Indicação:

Formulação antibiótica de amplo espectro de ação, com atividade primariamente bacteriostática sobre um grande número de micro-organismos Gram-Positivos e Gram-Negativos, sendo especialmente indicado no controle e tratamento de infecções em Aves e Suínos, tais como a Colibacilose (*Escherichia coli*), Cólera Aviária (*Pasteurella multocida*), Doença de Glasser (*Haemophilus parasuis*), Diarreia do Desmame e Enterites (*Escherichia coli*) e a Pneumonia bacteriana (*Pasteurella multocida*).

Dosagem:

Aves: Para o controle e tratamento dos micro-organismos sensíveis, fornecer 20 mg de Oxitetraciclina base por kg de Peso vivo equivalente à adição de 500 gramas por tonelada de ração durante 7 a 14 dias consecutivos.

Suínos: Para o controle e tratamento dos micro-organismos sensíveis, fornecer 15 mg de Oxitetraciclina base por kg de Peso vivo equivalente à adição de 750 gramas por tonelada de ração durante 7 a 14 dias consecutivos.

Modo de Utilização:

Recomenda-se realizar uma pré-mistura da dosagem calculada em uma pequena quantidade de reação antes de misturar a quantidade prevista de ração para o consumo.

A ração medicada deve ser a punica fonte de alimento durante o período alimentar.

Modo de Conservação:

Manter as embalagens fechadas em local seco e fresco, protegidos da luz e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Preparações de Oxitetraciclina devem ser armazenadas em temperaturas inferior a 40° C, de preferência entre 15° C e 30° C.

Medidas de Precaução:

Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.

Alterações nas dosagens somente através de prescrição e orientação do Médico Veterinário.

A ração medicada deverá ser a única fonte de alimento administrada aos suínos e às aves durante o tratamento.

Manter o produto longe do alcance das crianças.

As embalagens vazias devem ser enterradas ou incineradas. Não descartar em rios ou lagos.

Contra indicações e limitações de uso:

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

A absorção das Tetraciclinas pode ser afetada na presença de Hidróxido de Alumínio, bicarbonato de sódio, sais de cálcio, de magnésio e preparações de ferro.

Período de Carência:

Frango de Corte: Suspender o uso da medicação das aves 5 dias antes do abate.

Ovos: Suspender o uso da medicação das aves 3 dias antes de destinar os ovos para o consumo humano.


Suíno: Suspender o uso da medicação 3 dias antes do abate.

Apresentação:

Embalagem contendo saco de 25 kg.

OXITOP

RESOLVE



Atenção:

O Oxitop não se destina para uso em seres humanos

Classe Terapêutica:

Antimicrobiano

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):

Licença nº 10.093. Aprovado em 09/06/2015

Responsável Técnico:

Dr.Luis Cesar Bellagamba - CRMV SP 02744